

この説明書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

せっしょういん 折衝飲エキス〔細粒〕73

折衝飲（せっしょういん）は下腹部に痛みがある方の、生理不順、ときに吐き気などを伴う生理痛や月経困難といった女性の悩みに効く漢方薬です。血行不良や冷えなどによる神経痛、腰痛、肩こりにも効果があります。

！・使用上の注意・



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

・効能・効果・

体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症：

月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2~3時間を持ちます。)

年齢	1回量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1包	2.0g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3g	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7g	
2歳未満	1/4包	0.5g以下	

[用法・用量に関する注意]

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ボタンピ	1.5g	トウキ	2.5g
センキュウ	1.5g	エンゴサク	1.0g
シャクヤク	1.5g	ゴシツ	1.0g
ケイヒ	1.5g	コウカ	0.5g
トウニン	2.5g		

上記より製した折衝飲水製エキス5.0g(乾燥物換算で約2.5gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、結晶セルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 松浦薬業株式会社
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21